pst-diffraction
Diffraction à l'infini par une fente rectangulaire, deux fentes rectangulaires, un trou circulaire, deux trous circulaires, un trou triangulaire.

—

v. 2.10a(2007/09/06)

Manuel Luque
ml@PSTricks.de

Herbert Voß*
hv@PSTricks.de

8 septembre 2007

Table des matières

* Merci à Julien Cubizolles

1 Présentation et Montage



Ceci est la reproduction de montage proposé par Henri BOUASSE dans son livre sur la diffraction, page 25, publié aux éditions Delagrave en 1 925. Les commentaires dont il accompagne ce schéma sont les suivants :

« Une source ponctuelle unique S, très éloignée ou placée dans le plan focal principal de la lentille collimatrice L′, fournit un faisceau cylindrique unique de rayons. On le reçoit sur le plan E, percé d'un trou T dont la forme caractérise le phénomène étudié. Au-delà de l'écran E la lumière est diffractée *une infinité de directions*, ou si l'on veut suivant une infinité de faisceaux cylindriques. Les rayons diffractés dans chaque direction sont concentrés aux divers points du plan focal image d'une lunette accommodée sur l'infini, où ils forment la *figure de diffraction* : d'où le nom de *phénomène à l'infini*. De chaque faisceau cylindrique diffracté, l'objectif L de la lunette donne une image au point P de son plan focal principal. [...]Au point P correspond un faisceau cylindrique antérieur à l'objectif qui fait avec l'axe optique l'angle θ tel que : $\overline{\mathrm{OP}} = \mathrm{f}\tan\theta \approx \theta$ »

Ces quelques commandes réalisées avec `PSTricks` permettent d'obtenir les figures de diffraction *à l'infini*, en lumière monochromatique, d'un trou rectangulaire, d'un trou circulaire, de deux trous circulaires et d'un trou triangulaire.

Les dimensions des ouvertures sont bien sûr paramétrables, ainsi que le choix de la longueur d'onde : la couleur s'adapte automatiquement, et des divers paramètres du montage.

Il y a trois commandes, l'une pour les ouvertures rectangulaires, l'autre pour les ouvertures circulaires et la dernière pour une ouverture triangulaire.

```
\psdiffractionRectangle[<liste de paramètres>]
\psdiffractionCircular[<liste de paramètres>]
\psdiffractionTriangle[<liste de paramètres>]
```

Nous allons passer en revue ces différentes commandes et leurs paramètres.

2 La couleur de la radiation

La longueur d'onde est définie par le paramètres `[lambda=632]` (si l'on veut du rouge de longueur d'onde : $\lambda = 632$ nm), cette valeur est donc en nm. La conversion de la longueur d'onde dans le système rgb est une adaptation en postscript de celle qu'on trouve sur : `http://www.physics.sfasu.edu/astro/color.html`.

3 Diffraction par une ouverture rectangulaire



On donnera la largeur de la fente [a] et le paramètre [k] qui déterminera la hauteur de la fente $h = k \times a$. On choisira aussi la distance focale de la lentille [a], la résolution du tracé par la dimension du [pixel]. On pourra jouer sur le contraste pour rendre les franges éloignées un peu plus visibles avec [contrast]et éventuellement, obtenir un tracé en niveaux de gris en négatif inverse avec [colorMode=0] ou negativ avec [colorMode=1] ou cmyk couleur avec [colorMode=2] ou rgb avec [colorMode=3].

Par défaut les paramètres ont les valeurs suivantes :

- [a=0.2e-3] en m ;
- [k=1] ;
- [f=5] en m ;
- [lambda=650] en nm ;
- [pixel=0.5] ;
- [contrast=38], valeur maximale ;
- [colorMode=3].



\psdiffractionRectangle[f=2.5]

\psdiffractionRectangle[a=0.5e-3,k=0.5,f=4,colorMode=0]



\psdiffractionRectangle[a=0.5e-3,k=2,f=10,lambda=515,colorMode=1]

\psdiffractionRectangle[a=0.5e-3,k=20,f=10,lambda=450]

4 Diffraction par deux fentes parallèles identiques

Cette superbe simulation est une contribution de Julien CUBIZOLLES.

Il est aussi possible de représenter la figure de diffraction d'un système de deux fentes parallèles identiques décalées sur l'axe x. On utilise pour cela l'option [twoSlit] (désactivée par défaut), la distance entre les fentes étant réglée par le paramètre s, égal à 12e-3 m par défaut. Les paramètre des fentes sont ceux de l'ouverture rectangulaire (voir le paragraphe précédent).



\psdiffractionRectangle[a=0.5e-3,k=10,f=10,pixel=0.5,lambda=650,twoSlit,s=2e-3]